


GRZEGORZ BOBIŃSKI (Toruń)

Geometria rozmaitości modułów*

W tym artykule k oznaczać będzie ustalone ciało algebraicznie domknięte. Od czasu wyników Gabriela [21] wiadomo, że badanie (skończenie wymiarowych) modułów nad skończenie wymiarowymi k -algebrami jest równoważne badaniu (skończenie wymiarowych) reprezentacji skończonych ograniczonych kołczanów. Przypomnijmy, że kołczan $\Delta = (\Delta_0, \Delta_1)$ to zorientowany graf, tzn. zbiór Δ_0 wierzchołków wraz ze zbiorem Δ_1 strzałek pomiędzy tymi wierzchołkami. Skończoność kołczanu oznacza, że zbiory Δ_0 i Δ_1 są skończone. Przykładem kołczanu jest




Drogą (zorientowaną) w kołczanie Δ nazywamy ciąg $\gamma_1 \cdots \gamma_t$ strzałek $\gamma_1, \dots, \gamma_t$ takich, że koniec strzałki γ_i jest początkiem strzałki γ_{i+1} dla $i = 1, \dots, t - 1$. Liczbę t nazywamy długością powyższej drogi. Rozważa się też drogi długości 0 związane z poszczególnymi wierzchołkami. Z kołczanem Δ stowarzysza się algebrę $k\Delta$, zwaną algebrą dróg kołczanu Δ , w następujący sposób. Elementami algebry $k\Delta$ są formalne k -liniowe kombinacje dróg w kołczanie Δ , zaś mnożenie w algebrze $k\Delta$ indukowane jest przez składanie dróg.

* Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego podczas XVI Zjazdu Matematyków Polskich odbywającego się w dniach od 5 do 9 września 2005 roku we Wrocławiu. Autor artykułu jest laureatem nagrody im. K. Kuratowskiego w roku 2005 (przypis Redakcji).

Formalną k -liniową kombinację dróg długości co najmniej 2 o tym samym początku i końcu nazywamy relacją w kołczanie Δ ; wykluczamy drogi długości 1 i 0, aby uniknąć niejednoznaczności kołczanu odpowiadającego danej algebrze. Zbiór R relacji w kołczanie Δ nazywamy dopuszczalnym, jeśli istnieje liczba całkowita dodatnia n taka, że wszystkie drogi długości n w kołczanie Δ należą do ideału $\langle R \rangle$ generowanego przez zbiór R — ten warunek jest niezbędny dla zapewnienia jednoznaczności kołczanu i jest on konieczny dla zagwarantowania skończoności wymiaru algebry $k\Delta/\langle R \rangle$. Kołczan Δ wraz z dopuszczalnym zbiorem R (może być pusty) relacji nazywamy kołczanem ograniczonym. Mówimy też, że algebra $k\Delta/\langle R \rangle$ jest algebrą dróg kołczanu ograniczonego (Δ, R)

Reprezentacja M kołczanu Δ powstaje przez zastąpienie wierzchołków x kołczanu Δ (skończenie wymiarowymi) przestrzeniami liniowymi M_x oraz strzałek $\gamma : x \rightarrow y$ przekształceniami liniowymi $M_\gamma : M_x \rightarrow M_y$. Dla przykładu reprezentacją kołczanu przedstawionego powyżej jest każdy układ



gdzie M_1, M_2, M_3 i M_4 są przestrzeniami liniowymi, zaś $M_\alpha, M_\beta, M_\gamma, M_\delta$ i M_ϵ przekształceniami liniowymi pomiędzy odpowiednimi przestrzeniami. Przekształcenia liniowe $M_\gamma, \gamma \in \Delta_1$, w naturalny sposób indukują odwzorowania liniowe dla dróg i relacji. Reprezentacjami kołczanu ograniczonego (Δ, R) nazywamy te reprezentacje kołczanu Δ , dla których odwzorowania liniowe odpowiadające relacjom ze zbioru R są zerowe. Zatem, gdyby w rozważanym przykładzie założyć, że $R = \{\gamma\alpha - \delta\beta, \epsilon^2\}$, to interesowałyby nas te reprezentacje M , dla których

$$M_\gamma M_\alpha = M_\delta M_\beta \quad \text{oraz} \quad M_\epsilon^2 = 0.$$

Zdefiniowana w powyższy sposób kategoria równoważna jest kategorii mod $k\Delta/\langle R \rangle$ (skończenie wymiarowych) modułów nad algebrą $k\Delta/\langle R \rangle$. Będziemy często utożsamiać reprezentacje kołczanu ograniczonego (Δ, R) oraz $k\Delta/\langle R \rangle$ -moduły. Ponadto, dla każdej (skończenie wymiarowej) algebry Λ istnieje kołczan ograniczony taki, że kategorie mod Λ i mod $k\Delta/\langle R \rangle$ są równoważne. Będziemy zatem odtąd zakładać, że wszystkie rozważane algebry są postaci $k\Delta/\langle R \rangle$, dla kołczanów ograniczonych (Δ, R) .

Ustalmy kołczan ograniczony (Δ, R) . Dla reprezentacji M kołczanu (Δ, R) ciąg

$$\mathbf{dim} M = (\dim_k M_x)_{x \in \Delta_0} \in \mathbb{N}^{\Delta_0}$$

nazywamy wektorem wymiaru reprezentacji M . Jeśli M jest reprezentacją o wektorze wymiaru $\mathbf{d} = (d_x)_{x \in \Delta_0}$, to bez straty ogólności możemy założyć, że $M_x = k^{d_x}$, $x \in \Delta_0$, a więc reprezentacja M zadana jest przez przekształcenia M_γ , $\gamma \in \Delta_1$, które możemy utożsamić z odpowiadającymi im macierzami. Zauważmy, że jeśli mamy ciąg macierzy należący do przestrzeni afinicznej

$$\mathbb{A}(\mathbf{d}) = \prod_{\gamma: x \rightarrow y} \mathbb{M}(d_y, d_x),$$

to podobnie jak wcześniej indukuje on w naturalny sposób macierze odpowiadające drogom i relacjom. Zatem reprezentacje kołczanu ograniczonego (Δ, R) o wektorze wymiaru \mathbf{d} możemy utożsamiać z tymi ciągami macierzy należącymi do przestrzeni $\mathbb{A}(\mathbf{d})$, dla których macierze odpowiadające relacjom ze zbioru R są zerowe. Zbiór takich macierzy oznaczamy $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$, gdzie Λ jest algebrą dróg kołczanu (Δ, R) . Zbiór $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ jest domkniętym (w topologii Zariskiego, patrz [2]) podzbiorem przestrzeni afinicznej $\mathbb{A}(\mathbf{d})$, jest więc rozmaitością afiniczną, którą nazywamy rozmaitością Λ -modułów o wektorze wymiaru \mathbf{d} . Na rozmaitości $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ działa grupa algebraiczna $\text{GL}(\mathbf{d}) = \prod_x \text{GL}(d_x)$ zgodnie ze wzorem

$$(g \cdot M)_\gamma = g_y M_\gamma g_x^{-1}, \quad \gamma: x \rightarrow y.$$

Orbity tego działania odpowiadają klasom izomorfizmu Λ -modułów o wektorze wymiaru \mathbf{d} .

Warto podkreślić, że jeśli M jest Λ -modułem, to wektor wymiaru $\mathbf{dim} M$ modułu M można zdefiniować w terminach algebr i modułów, zliczając krotności wystąpień prostych Λ -modułów jako ilorazów w ciągu kompozycyjnym (wierzchołki kołczanu Δ odpowiadają bowiem klasom izomorfizmu prostych Λ -modułów). Należy też dodać, że istnieje możliwość zdefiniowania rozmaitości modułów bez wykorzystywania języka kołczanów i ich reprezentacji. Jak pokazał Bongartz w pracy [13], oba te podejścia, mimo iż prowadzą do innych obiektów, są jednak równouprawnione z punktu widzenia geometrycznych własności rozważanych obiektów.

Będziemy odtąd swobodnie stosować podstawowe pojęcia geometrii algebraicznej takie jak nieprzywiedlność, normalność bądź wymiar $\dim \mathcal{V}$ rozmaitości \mathcal{V} (patrz [28], także [2]). Wykorzystywać też będziemy elementarne definicje algebry homologicznej, w szczególności wymiar globalny $\text{gl. dim } \Lambda$ algebry Λ , oraz wymiary projektywny $\text{pd}_\Lambda M$ oraz injektywny $\text{id}_\Lambda M$ Λ -modułu M (patrz [17], także [1]).

Zdefiniowanie rozmaitości modułów otwiera dwie podstawowe drogi stosowania ich w teorii reprezentacji algebr. Pierwszy kierunek polega na badaniu rozmaitości modułów i próbach zastosowania uzyskanej w ten sposób wiedzy do odpowiedzi na pytania stawiane w teorii reprezentacji algebr. Druga możliwość to wnioskowanie dla algebry Λ o własnościach geometrycznych rozmaitości $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$, $\mathbf{d} \in \mathbb{N}^{\Delta_0}$, na podstawie znajomości kategorii $\text{mod } \Lambda$. Przykładem wyniku wpisującego w pierwszy schemat działania jest obserwacja poczyniona przez Kashiwarę i Saito w pracy [26], zgodnie z którą elementy kanonicznej bazy ujemnej części skwantowanej algebry obejmującej stowarzyszonej z kołczanem Dynkina odpowiadają składowym nieprzywiedlnym rozmaitości modułów nad odpowiednią algebrą preprojektywną. Obserwacja ta była między innymi wykorzystywana przez Geissa i Schröera w pracy [23]. Innym zastosowaniem jest uzyskana przez Geissa w pracy [22] geometryczna charakteryzacja algebr oswojonego typu reprezentacyjnego.

Wydaje się jednak, że bardziej popularny jest kierunek prowadzący od wiedzy o kategorii modułów do własności rozmaitości modułów. Do tego właśnie nurtu należą prowadzone przeze mnie badania. Podstawowymi pytaniami, które można zadać w tym kontekście, są pytania o wymiar i składowe nieprzywiedlne rozmaitości modułów, a także jej normalność, bądź bardziej ogólnie typy osobliwości, które mogą się pojawić. W sytuacji, gdy Λ jest algebrą dziedziczną, tzn. $\text{gl. dim } \Lambda \leq 1$, co jest równoważne stwierdzeniu, że zbiór relacji w stowarzyszonej kołczanie ograniczonym jest pusty, rozmaitości $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$, $\mathbf{d} \in \mathbb{N}^{\Delta_0}$, są przestrzeniami afinicznymi, więc odpowiedzi na powyższe pytania są znane. Dla odmiany w sytuacji, gdy algebra Λ nie jest dziedziczna oraz \mathbf{d} jest wiernym wektorem wymiaru (tzn. wszystkie współrzędne wektora \mathbf{d} są dodatnie), to rozmaitość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ nie tylko nie jest przestrzenią afiniczną, ale jest nawet osobliwa, zatem pytania powyższe stają się interesujące.

Aby zaprezentować przykładowy wynik, niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych definicji. Algebrę Λ nazywamy oswojoną, jeśli dla każdego wektora wymiaru \mathbf{d} istnieją odwzorowania regularne $\Phi_1, \dots, \Phi_l : k \rightarrow \text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ takie, że dla każdego modułu nierozkładalnego X o wektorze wymiaru \mathbf{d} istnieją indeks $i \in \{1, \dots, l\}$ oraz element $\lambda \in k$ takie, że $X \simeq \Phi_i(\lambda)$. Nierozkładalny moduł nazywamy kierującym, jeśli nie istnieje ciąg niezerowych nieizomorfizmów pomiędzy nierozkładalnymi modułami zaczynający i kończący się w tym module.

Następujące twierdzenie zostało udowodnione wspólnie ze Skowrońskim w pracy [8].

TWIERDZENIE 1. *Niech \mathbf{d} będzie wektorem wymiaru modułu kierującego nad oswojoną algebrą Λ . Wtedy:*

- (1) *rozmaitość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ jest zupełnym przekrojem i $\dim \text{mod}_\Lambda(\mathbf{d}) = \dim \text{GL}(\mathbf{d}) - 1$,*

- (2) mnogość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ ma co najwyżej dwie składowe nieprzywiedlne,
 (3) mnogość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ jest normalna wtedy i tylko wtedy, gdy jest nieprzywiedlna.

Przypuśćmy, że $\Lambda = k\Delta/\langle R \rangle$ oraz załóżmy, że zbiór R jest minimalny. Wtedy w sytuacji opisanej w powyższym twierdzeniu liczba $\dim \text{GL}(\mathbf{d}) - 1$ jest równa wymiarowi przestrzeni $\Lambda(\mathbf{d})$ pomniejszonemu o liczbę równań opisujących mnogość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ pochodzących od zbioru R . W ogólnym przypadku różnicę tę oznacza się symbolem $a(\mathbf{d})$. W badaniach geometrycznych można często założyć, że rozważany wektor wymiaru jest wierny. Przy tym dodatkowym założeniu wiadomo, że w sytuacji rozważanej w Twierdzeniu 1 algebra Λ jest kwaziodwrócona, tzn. $\text{gl. dim } \Lambda \leq 2$ oraz dla każdego nierozkładalnego modułu Y , $\text{pd}_\Lambda Y \leq 1$ lub $\text{id}_\Lambda Y \leq 1$. Zatem poniższe twierdzenie pochodzące z pracy [7] stanowi naturalne uogólnienie Twierdzenia 1.

TWIERDZENIE 2. Niech \mathbf{d} będzie wektorem wymiaru nierozkładalnego modułu nad oswojoną algebrą kwaziodwróconą Λ . Wtedy:

- (1) mnogość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ jest zupełnym przekrojem wymiaru $a(\mathbf{d})$,
 (2) mnogość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ ma co najwyżej dwie składowe nieprzywiedlne,
 (3) mnogość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ jest normalna wtedy i tylko wtedy, gdy jest nieprzywiedlna.

Faktem przyciągającym uwagę w powyższych twierdzeniach jest równoważność normalności i nieprzywiedlności mnogości modułów. Również inne, uzyskane w pracach [5, 9], rezultaty sugerowały istnienie związku między tymi własnościami w rozważanych sytuacjach. Obserwacja ta została potwierdzona przez uzyskane niedawno w pracy [6] następujące twierdzenie:

TWIERDZENIE 3. Załóżmy, że Λ jest algebrą kwaziodwróconą taką, że istnieją pełne podkategorie \mathcal{X} i \mathcal{Y} kategorii modułów o następujących własnościach:

- (1) podkategorie \mathcal{X} i \mathcal{Y} są zamknięte ze względu na sumy proste i składniki proste,
 (2) każdy Λ -moduł jest sumą prostą modułów z podkategorii \mathcal{X} i \mathcal{Y} ,
 (3) $\text{pd}_\Lambda M \leq 1$, dla wszystkich modułów $M \in \mathcal{X}$, oraz $\text{id}_\Lambda N \leq 1$, dla wszystkich modułów $N \in \mathcal{Y}$,
 (4) $\text{Hom}_\Lambda(N, M) = 0$ oraz $\text{Ext}_\Lambda^1(M, N) = 0$ dla wszystkich modułów $M \in \mathcal{X}$ i $N \in \mathcal{Y}$,
 (5) dla każdego wektora wymiaru \mathbf{d} , zbiory $\{M \in \text{mod}_\Lambda(\mathbf{d}) \mid M \in \mathcal{X}\}$ oraz $\{N \in \text{mod}_\Lambda(\mathbf{d}) \mid N \in \mathcal{Y}\}$ są otwarte w mnogości $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$.

Jeśli \mathbf{d} jest wektorem wymiaru takim, że spełniony jest jeden z poniższych warunków:


- (1) istnieje moduł M o wektorze wymiaru \mathbf{d} taki, że $M \in \mathcal{X}$,
 (2) istnieje moduł N o wektorze wymiaru \mathbf{d} taki, że $N \in \mathcal{Y}$,

(3) istnieją moduły X i Y o wektorze wymiaru \mathbf{d} takie, że $\text{pd}_\Lambda X \leq 1$ oraz $\text{id}_\Lambda Y \leq 1$,

to rozmaiłość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ jest normalna wtedy i tylko wtedy, gdy jest nieprzywiedlna.

Warto podkreślić, że dla dowolnej algebry kwaziodwróconej istnienie podkategorii \mathcal{X} i \mathcal{Y} spełniających warunki (1)–(4) wypisane powyżej jest znane ([25]). Nie jest jednak jasne, czy można je skonstruować w ten sposób, aby spełniony był warunek (5). Wydaje się, że wykorzystując informacje o strukturze kategorii modułów nad algebraami kwaziodwróconymi uzyskane dzięki pracy [24] (patrz także [27, 30]), powinno być możliwe zweryfikowanie takiej hipotezy.

Twierdzenia 1 oraz 2 w istotnym stopniu bazowały na znajomości kategorii modułów nad oswojonymi algebraami kwaziodwróconymi (opisanych w pracach [27, 31, 33, 34]). Powyższe twierdzenie było jednym z narzędzi umożliwiających badanie rozmaiłości modułów nad dzikimi (tzn. nie oswojonymi) algebraami. Obiektem zainteresowania w pracy [6] są algebrae kanoniczne (w sensie Ringela [33]). Warto wspomnieć, że rozmaiłości modułów nad tymi algebraami były też badane wcześniej przy pomocy innych metod przez Barota i Schröera w pracy [3]. Dla każdego ciągu $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_n)$, $n \geq 3^*$, liczb całkowitych większych od 2^{**} oraz ciągu $\lambda = (\lambda_3, \dots, \lambda_n)$ parami różnych niezerowych elementów ciała k rozważamy kołczan



ograniczony przez relacje

$$\gamma_{1,1} \cdots \gamma_{1,m_1} + \lambda_i \gamma_{2,1} \cdots \gamma_{2,m_2} - \gamma_{i,1} \cdots \gamma_{i,m_i}, \quad i \in \{3, \dots, n\}.$$

Algebrę dróg opisanego powyżej kołczanu ograniczonego nazywamy algebra kanoniczną typu \mathbf{m} . Wiadomo, że algebra kanoniczna typu \mathbf{m} jest oswojona wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{1}{m_1} + \cdots + \frac{1}{m_n} \geq n - 2.$$

* Oryginalna definicja dopuszcza także możliwość $n = 2$, jednak w tej sytuacji otrzymujemy algebrae dziedziczne, więc dla prostoty rozważań pomijamy ten przypadek.

** Dla $n = 2$ dopuszcza się także przypadki, gdy $m_1 = 1$ lub $m_2 = 1$.

Szczególnym zainteresowaniem, także z geometrycznego punktu widzenia, cieszą się moduły regularne nad algebraami kanonicznymi (patrz na przykład [18, 19, 35]). Wiadomo, że wektor \mathbf{d} jest wektorem wymiaru modułu regularnego nad algebraą kanoniczną typu \mathbf{m} wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki

$$d_\alpha = d_\omega,$$

$$(l-1)d_\alpha \leq d_{i_1, j_1} + \cdots + d_{i_l, j_l},$$

gdzie $1 \leq i_1 < \cdots < i_l \leq n$ oraz $j_p \in \{1, \dots, m_{i_p} - 1\}$ dla $p = 1, \dots, l$, $l \in \{1, \dots, n\}$.

Następujące twierdzenie zostało udowodnione w pracy [6]:

Twierdzenie 4. *Niech Λ będzie algebraą kanoniczną typu \mathbf{m} . Wtedy rozmaitość $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$ jest normalna dla każdego wektora wymiaru \mathbf{d} Λ -modułu regularnego wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\frac{1}{m_1-1} + \cdots + \frac{1}{m_n-1} > 2n - 5.$$

Powróćmy teraz do rozważanej wcześniej sytuacji modułu kierującego X nad algebraą oswojoną Λ . Wiadomo, że w tym przypadku jedną ze składowych nieprzywiedlnych rozmaitości $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{dim} X)$ jest domknięcie $\overline{\mathcal{O}}_X$ $\text{GL}(\mathbf{dim} X)$ -orbity \mathcal{O}_X modułu X . Zgodnie ze wspólnym wynikiem autora i Zwary uzyskanym w pracy [12] składowa ta jest normalna także w sytuacji, gdy cała rozmaitość nie jest nieprzywiedlna. Jeśli założymy (co nie powoduje utraty ogólności rozważań), że wektor wymiaru modułu X jest wierny, to wiadomo, że $\text{pd}_\Lambda X \leq 1$ oraz $\text{id}_\Lambda X \leq 1$ (patrz [33]). Zatem składowa $\overline{\mathcal{O}}_X$ jest szczególnym przypadkiem składowych opisanych przez Barota i Schröera w pracy [3]. Dokładniej, pokazali oni, że jeśli \mathbf{d} jest wektorem wymiaru nad algebraą kwaziodwróconą Λ , to domknięcie $\mathcal{P}(\mathbf{d})$ zbioru modułów projektywnego wymiaru co najwyżej 1 jest (o ile jest niepuste) składową nieprzywiedlną rozmaitości $\text{mod}_\Lambda(\mathbf{d})$. Podobnie rzecz ma się z domknięciem $\mathcal{I}(\mathbf{d})$ zbioru składającego się z modułów injektywnego wymiaru co najwyżej 1. Zatem udowodnienie następującej hipotezy stanowiłoby uogólnienie wspomnianego wyżej wyniku, a zarazem dawałoby bardziej dokładne zrozumienie Twierdzenia 3.

Hipoteza. *Niech Λ będzie algebraą kwaziodwróconą. Wtedy dla dowolnego wektora wymiaru \mathbf{d} składowe $\mathcal{P}(\mathbf{d})$ i $\mathcal{I}(\mathbf{d})$ są normalne.*

W poprzednim akapicie widać było, że w szczególnych sytuacjach pytania o własności rozmaitości modułów (ogólniej, składowych nieprzywiedlnych rozmaitości modułów) sprowadzają się do badania domknięć orbit modułów. Ten kierunek badań był i jest rozwijany niezależnie od badań rozmaitości modułów (patrz na przykład [4, 14, 32, 39]). Przez długi czas uwagę matematyków zajmujących się tą problematyką zaprzętał problem scharakteryzowania w terminach algebraicznych, kiedy $M \in \overline{\mathcal{O}}_N$ dla Λ -modułów M

i N o tym samym wektorze wymiaru. Bongartz udowodnił w pracy [15], że jeśli istnieje ciąg dokładny postaci

$$0 \rightarrow U \rightarrow N \rightarrow V \rightarrow 0$$

taki, że $M \simeq U \oplus V$, to $M \in \overline{\mathcal{O}}_N$. Z drugiej strony Riedtmann pokazała w pracy [32], że jeśli $M \in \overline{\mathcal{O}}_N$, to

$$\dim_K \operatorname{Hom}_\Lambda(M, U) \geq \dim_K \operatorname{Hom}_\Lambda(N, U)$$

dla dowolnego Λ -modułu U . Uogólniła ona także powyższą obserwację Bongartz dowodząc, że jeśli istnieje ciąg dokładny postaci


$$0 \rightarrow Z \rightarrow Z \oplus N \rightarrow M \rightarrow 0$$

dla pewnego Λ -modułu Z , to $M \in \overline{\mathcal{O}}_N$. Zvara pokazał w pracy [37], że ostatni z powyższych warunków jest równoważny przynależności modułu M do domknięcia orbity modułu N .

Badaniami dotyczącymi głębiej struktury geometrycznej domknięć orbit są pytania o typy osobliwości, które mogą się pojawić w tym kontekście. Tego rodzaju pytania są ważne i nietrywialne także w przypadku algebr dziedzicznych, a więc algebr dróg kołczanów bez relacji. Następujące twierdzenie podsumowuje wyniki uzyskane przez autora wspólnie ze Zwarą w pracach [10, 11].

TWIERDZENIE 5. *Niech Δ będzie kołczanem Dynkina typu \mathbb{A}_n , $n \geq 1$, lub typu \mathbb{D}_n , $n \geq 4$. Wtedy dla każdej reprezentacji X kołczanu Δ domknięcie jej orbity w rozmaitości $\operatorname{mod}_{k\Delta}(\dim X)$ jest normalną rozmaitością Cohena-Macaulaya.*

Przypomnijmy, że kołczan Δ nazywamy kołczanem Dynkina typu \mathbb{A}_n , $n \geq 1$, jeśli stowarzyszony z nim (niezorientowany) graf $\overline{\Delta}$ (tzn. graf posiadający te same wierzchołki co kołczan Δ i w którym strzałki kołczanu Δ zostały zastąpione krawędziami) jest postaci




Podobnie, kołczan Δ nazywamy kołczanem Dynkina typu \mathbb{D}_n , $n \geq 4$, gdy graf $\overline{\Delta}$ jest postaci



Wspólną cechą kołczanów powyższych dwóch typów jest to, iż są to kołczany skończonego typu reprezentacyjnego, tzn. jeśli Δ jest kołczanem jednego z powyższych dwóch typów, to istnieje tylko skończenie wiele parami nieizomorficznych nierozkładalnych reprezentacji kołczanu Δ .

Przykład przedstawiony przez Zwarę w [38] pokazuje, że wynik analogiczny do Twierdzenia 5 nie może zachodzić dla kołczanów, które nie są skończonego typu reprezentacyjnego. Otwarte pozostaje pytanie, czy twierdzenie to jest prawdziwe dla pozostałych kołczanów skończonego typu reprezentacyjnego, a więc kołczanów typu \mathbb{E}_n , $n = 6, 7, 8$, gdzie \mathbb{E}_n , $n \geq 6$, jest grafem postaci



Na koniec zaznaczmy, że istotnym elementem w dowodzie powyższego twierdzenia była możliwość porównania osobliwości pojawiających się w domknięciach orbit modułów z osobliwościami występującymi w rozmaitościach Schuberta w rozmaitościach flag ([29, 36]) oraz odpowiednich produktach grassmanianów ([16, 20]).

Literatura

- [1] S. Balcerzyk, *Wstęp do algebry homologicznej*, Biblioteka Matematyczna 34, PWN, Warszawa, 1970.
- [2] S. Balcerzyk, T. Józefiak, *Pierścienie przemienne*, Biblioteka Matematyczna 58, PWN, Warszawa, 1985.
- [3] M. Barot, J. Schröer, *Module varieties over canonical algebras*, J. Algebra 246 (2001), 175–192.
- [4] J. Bender, K. Bongartz, *Minimal singularities in orbit closures of matrix pencils*, Linear Algebra Appl. 365 (2003), 13–24.
- [5] G. Bobiński, *Geometry of decomposable directing modules over tame algebras*, J. Math. Soc. Japan, 54 (2002), 609–620.
- [6] —, *Geometry of regular modules over canonical algebras*, Tran. Amer. Math. Soc., w druku.
- [7] G. Bobiński, A. Skowroński, *Geometry of modules over tame quasi-tilted algebras*, Colloq. Math. 79 (1999), 85–118.
- [8] —, —, *Geometry of directing modules over tame algebras*, J. Algebra 215 (1999), 603–643.
- [9] —, *Geometry of periodic modules over tame concealed and tubular algebras*, Algebr. Represent. Theory 5 (2002), 187–200.
- [10] G. Bobiński, G. Zvara, *Normality of orbit closures for Dynkin quivers of type A_n* , Manuscripta Math. 105 (2001), 103–109.
- [11] G. Bobiński, G. Zvara, *Schubert varieties and representations of Dynkin quivers*, Colloq. Math. 94 (2002), 285–309.
- [12] —, *Normality of orbit closures for directing modules over tame algebras*, J. Algebra 298 (2006), 120–133.
- [13] K. Bongartz, *A geometric version of the Morita equivalence*, J. Algebra 139 (1991), 159–171.

- [14] —, *Minimal singularities for representations of Dynkin quivers*, Comment. Math. Helv. **69** (1994), 575–611.
- [15] —, *On degenerations and extensions of finite-dimensional modules*, Adv. Math. **121** (1996), 245–287.
- [16] M. B r i o n, *Multiplicity-free subvarieties of flag varieties*, in: *Commutative Algebra (Grenoble/Lyon, 2001)*, Contemp. Math. **331**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003, 13–23.
- [17] H. C a r t a n, S. E i l e n b e r g, *Homological Algebra*, Princeton Landmarks in Mathematics, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1999.
- [18] M. D o m o k o s, H. L e n z i n g, *Invariant theory of canonical algebras*, J. Algebra **228** (2000), 738–762.
- [19] —, *Moduli spaces for representations of concealed-canonical algebras*, J. Algebra **251** (2002), 371–394.
- [20] D. E i s e n b u d, J. H a r r i s, *The Geometry of Schemes*, Graduate Texts in Mathematics **197**, Springer-Verlag, New York, 2000.
- [21] P. G a b r i e l, *Unzerlegbare Darstellungen. I*, Manuscripta Math. **6** (1972), 71–103.
- [22] Ch. G e i s s, *On degenerations of tame and wild algebras*, Arch. Math. (Basel) **64** (1995), 11–16.
- [23] Ch. G e i s s, J. S c h r ö e r, *Varieties of modules over tubular algebras*, Colloq. Math. **95** (2003), 163–183.
- [24] D. H a p p e l, *A characterization of hereditary categories with tilting object*, Invent. Math. **144** (2001), 381–398.
- [25] D. H a p p e l, I. R e i t e n, S. S m a l ø, *Tilting in abelian categories and quasitilted algebras*, Mem. Amer. Math. Soc. **120** (1996), viii+ 88.
- [26] M. K a s h i w a r a, Y. S a i t o, *Geometric construction of crystal bases*, Duke Math. J. **89** (1997), 9–36.
- [27] O. K e r n e r, *Tilting wild algebras*, J. London Math. Soc. (2) **39** (1989), 29–47.
- [28] E. K u n z, *Introduction to Commutative Algebra and Algebraic Geometry*, Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 1985.
- [29] V. L a k s h m i b a i, P. M a g y a r, *Degeneracy schemes, quiver schemes, and Schubert varieties*, Internat. Math. Res. Notices **1998** (1998), 627–640.
- [30] H. L e n z i n g, A. S k o w r o ń s k i, *Quasi-titled algebras of canonical type*, Colloq. Math. **71** (1996), 161–181.
- [31] J. A. d e l a P e ń a, *Tame algebras with sincere directing modules*, J. Algebra **161** (1993), 171–185.
- [32] Ch. R i e d t m a n n, *Degenerations for representations of quivers with relations*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **19** (1986), 275–301.
- [33] C. M. R i n g e l, *Tame Algebras and Integral Quadratic Forms*, Lecture Notes in Mathematics **1099**, Springer, Berlin, 1984.
- [34] A. S k o w r o ń s k i, *Tame quasi-tilted algebras*, J. Algebra **203** (1998), 470–490.
- [35] A. S k o w r o ń s k i, J. W e y m a n, *Semi-invariants of canonical algebras*, Manuscripta Math. **100** (1999), 391–403.
- [36] T. A. S p r i n g e r, *Linear Algebraic Groups*, Progress in Mathematics **9**, Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 1998.
- [37] G. Z w a r a, *Degenerations of finite-dimensional modules are given by extensions*, Compositio Math. **121** (2000), 205–218.
- [38] —, *An orbit closure for a representation of the Kronecker quiver with bad singularities*, Colloq. Math. **97** (2003), 81–86.

- [39] —, *Regularity in codimension one of orbit closures in module varieties*, J. Algebra **283** (2005), 821–848.

Grzegorz Bobiński

Wydział Matematyki i Informatyki UMK

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

e-mail:gregbob@mat.uni.torun.pl