

PIERWSZE OBSERWACJE PLISZKI CYTRYNOWEJ (*Motacilla citreola*) NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ I POŁUDNIOWOPODLASKIEJ

W dniach 2 i 12 V 1995 nad Bugiem niedaleko miejscowości Mołozew (gm. Jabłonna Lacka, woj. siedleckie) obserwowaliśmy jednego samca pliszki cytrynowej. Zarówno podczas pierwszej jak i drugiej obserwacji ptak żerował na bagnistym brzegu rzeki i na mulistych wysepkach wśród niskiej roślinności. Możliwe, że były to dwa różne osobniki (Akceptacja KF PTZool.).

Obserwowane ptaki miały głowę, pierś, brzuch i pokrywy podogonowe barwy cytrynowożółtej, która rozjaśniała się ku tyłowi. Na karku posiadały czarny "kołnierz" (schodzący na boki szyi), który był najciemniejszym miejscem w upierzeniu. Grzbiet był barwy staloszarej. Zakończenia średnich i dużych pokryw skrzydłowych oraz krawędzie lotek trzeciorzędowych były białe, tworzyły wyraźne pasy skontrastowane z resztą skrzydła i grzbietem. Pokrywy skrzydłowe i lotki były szaroczarne, ciemniejsze niż grzbiet ale jaśniejsze od "kołnierza" na karku. Środkowe sterówki były czarne a skrajne białe. Dziób, nogi oraz tęczówki były czarne.

Pliszka cytrynowa jest gatunkiem zalatującym do Polski sporadycznie (Tomiałojć 1990). Do roku 1993 stwierdzono ją około 56 razy (Komisja Faunistyczna 1994). W roku 1994 wykryto pierwsze lęgi 4 par koło Rewy nad Zatoką Pucką (Komisja Faunistyczna 1995).

Literatura

- Komisja Faunistyczna 1994. *Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1993*.
Not. Om. 35: 331-346.
- Komisja Faunistyczna 1995. *Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1994*.
Not. Om. 36: 343-358.
- Tomiałojć L. 1990. *Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność*. PWN, Warszawa.

Konrad Sachanowicz, Wojciech Domański, Przemysław Chylarecki