

ACTION OF FUNGICIDAL PREPARATION CANESTEN  
(CLOTRIMAZOL), "BAYER", AND METRONIDAZOLE IN  
VITRO ON *T. VAGINALIS*

by

A. ZAREMBA E. MAŁYSZKO, J. TRYBUŁA, H. PONIECKA, L. STEPKA  
and H. SZARMACH

**Abstract.** The work is aimed at the estimation of the effectiveness of "Bayer" fungicide Canesten (Clotrimazol) on the cell of *T. vaginalis*. Experiments were carried out on 20 museum strains and 20 strains freshly isolated from the genitourinary tracts of men and women. The effectiveness of the action of Canesten on *Trichomonas* was estimated with regard to Metronidazole.

DZIAŁANIE PREPARATU GRZYBOJCZEGO CANESTEN (CLOTRIMAZOL)  
FIRMY „BAYER” I METRONIDAZOLU IN VITRO NA *T. VAGINALIS*

A. ZAREMBA, E. MAŁYSZKO \*, J. TRYBUŁA, H. PONIECKA, L. STEPKA i H. SZARMACH

Klinika Dermatologiczno-Wenerologiczna na AM, Białystok  
i  
Zakład Higieny Instytutu Medycyny Społecznej AM, Białystok

Badania przeprowadzono na 20 szczepach muzealnych i 20 świeżo wyizolowanych z dróg moczowo-płciowych mężczyzn i kobiet. Skuteczność działania Canestenu na rzęsistki oceniano w odniesieniu do Metronidazolu.

*Adres autorów \*:*  
15-222 Białystok, Mickiewicza 2c